



Portrait

Sédentaire, c'est le plus commun des Pics. Il mesure environ 30-35cm. Son plumage est verdâtre avec une crête rouge, aplatie sur la tête. Le mâle a une moustache rouge entourée de noir alors que la femelle l'a entièrement noire. Les pattes sont formées de telle sorte qu'il puisse s'agripper facilement sur les arbres. Il a donc 2 doigts vers l'avant et 2 doigts vers l'arrière. Il s'appuie sur sa queue lorsqu'il martèle, et sa longue langue visqueuse lui permet d'attraper les larves dont il se nourrit.

Son habitat

Absent de la Corse, on trouve le Pic vert dans les lisières de forêts, les bois clairs ou encore dans les jardins. Un espace ouvert lui est indispensable pour s'alimenter puisqu'il consomme aussi des fourmis.

Nidification

Le Pic commence à chercher un emplacement dès le début de l'année. Le martèlement lui sert à marquer son territoire et séduire une femelle. La loge définitive sera creusée pendant 3 semaines, en avril et garnie de copeaux de bois.

Une seule ponte a lieu, entre avril et juillet avec 5 à 7 œufs. Les jeunes naissent nus et aveugles. Ils sont nourris pendant 20 jours par les 2 parents. Ils restent encore près du nid avant de s'émanciper.

Protection

Espèce protégée par la loi de 1976 relative à la protection de la nature. Il est interdit de porter atteinte aux Pics ainsi qu'à leurs nids et leurs couvées, sous peine de poursuites et de sanctions judiciaires.

Petite Histoire

« Selon la légende, après le Déluge, la terre était si desséchée que Dieu demanda à tous les oiseaux de prendre chacun une goutte de rosée sur les arbres du paradis et de la rapporter sur terre. Le Pic vert refusa. Pour le punir, Dieu le condamna à ne jamais pouvoir se désaltérer. Depuis, il pleure et tape désespérément sur l'écorce des arbres pour y récolter la moindre goutte d'eau.

Il est appelé à la campagne "oiseau de pluie", car son chant moqueur est censé annoncer la pluie. »

Jan. Fév. Mar. Av. Mai Ju. Juil. Ao. Sept. Oct. Nov. Déc.

Période de présence en France



Quel avenir?

Ses effectifs sont en hausse en Europe.

Les principales menaces pour cette espèce sont la disparition des vergers et l'utilisation importante de pesticides.

Il peut toutefois causer des « dégâts » sur certains bâtiments, en creusant, le polystyrène par exemple. Ceci, sans doute pour marquer son territoire plus que pour s'y abriter. Aucune solution à long terme n'a été trouvée.